

Дитяче харчування ТМ «Kendamil»

Kendamil Дитяча суха молочна суміш 1 етап з народження до 6 місяців

Використання

- з народження в якості основного харчування або як доповнення до грудного молока
 - після грудного вигодовування або після будь-якої іншої дитячої суміші
 - може вживатися як грудне молоко за потребою - частота годувань і кількість суміші визначається вашою дитиною
- Склад:** цільне **молоко** (107 г (g) на 100 г (g), демінералізована сироватка збагачена альфа-лактальбуміном (з **молока**), рослинні олії (соняшникова, кокосова, ріпакова), лактоза (з **молока**), галакто-олігосахариди (з **молока**), знежирене **молоко**, кальцій цитрат, хлорид калію, лактат кальцію, цитрат натрію, холін бітарtrat, хлорид магнію, докозагексаєнова кислота, аскорбат натрію, гідроксид калію, інозитол, L-тирозин, арахідонова кислота, таурин, нуклеотиди (цитидин-5'-монофосфат, динатрію уридин-5'-монофосфат, аденозин-5-монофосфат, динатрій-інозин-5-монофосфат, динатрію монофосфат гуанозин-5'), L-фенілаланін, пірофосфат заліза, сульфат цинку, вітамін Е, ніацин, пантотенат кальцію, сульфат міді, тіамін, рибофлавін, вітамін А, вітамін В6, сульфат марганцю, фолієва кислота, йодид калію, селеніт натрію, вітамін К, вітамін D, біотин, вітамін В12.

Не містить глютену, без ГМО.

Інформація про склад		На 100 г	На 100 мл(мл)		мкг (µg)	22,0	2,8
Енергетична цінність (калорійність)	кДж (kj) ккал (kcal)	2170/520	280/67	Біотин			
Жири	г (g)	28,0	3,6	Мінерали			
з яких насичені	г (g)	9,0	1,2	Натрій	мг (mg)	160,0	21,0
з яких ненасичені	г (g)	19,0	2,4	Калій	мг (mg)	550,0	71,0
Вуглеводи	г (g)	56,0	7,2	Хлорид	мг (mg)	350,0	46,0
з яких цукри*	г (g)	53,0	6,8	Кальцій	мг (mg)	340,0	44,0
з яких лактоза	г (g)	51,0	6,6	Фосфор	мг (mg)	200,0	26,0
Клітковина (харчові волокна)	г (g)	3,0	0,4	Магній	мг (mg)	47,0	6,3
Білок (N x 6,25)	г (g)	10,1	1,3	Залізо	мг (mg)	5,7	0,7
з яких Сироватковий білок	г (g)	6,1	0,8	Цинк	мг (mg)	3,9	0,5
з яких Казеїновий білок	г (g)	4,0	0,5	Мідь	мг (mg)	0,41	0,053
Вітаміни				Йод	мкг (µg)	100,0	13,0
Вітамін А	мкг-RE (µg-RE)	450,0	59,0	Селен	мкг (µg)	19,0	2,5
Вітамін D	мкг (µg)	11,0	1,4	Марганець	мкг (µg)	60,0	8,0
Вітамін Е	мг-а- ТЕ (mg-a-TE)	17,0	2,2	Фтор	мг (mg)	<0,1	<0,015
Вітамін К	мкг (µg)	33,0	4,3	Інші			
Вітамін С	мг (mg)	90,0	12,0	Таурин	мг (mg)	45,0	5,8
Тіамін	мг (mg)	0,5	0,07	Холін	мг (mg)	170,0	22,0
Рибофлавін	мг (mg)	1,2	0,16	Інозитол	мг (mg)	100,0	13,0
Ніацин	мг (mg)	5,0	0,65	L Карнітин	мг (mg)	6,8	0,9
Вітамін В6	мг (mg)	0,41	0,05	Нуклеотиди	мг (mg)	22,0	2,8
Фолат / Фолієва кислота	мкг(DFE) (µg (DFE)	133,0	17,0	Омега 3			
Вітамін В12	мкг (µg)	1,3	0,17	α- Ліноленова кислота (ALA)	мг (mg)	390,0	50,0
Пантотенова кислота	мг (mg)	3,7	0,5	Докозагексаєнова кислота (DHA)	мг (mg)	125,0	16,1
				Омега 6			
				Ліноленова кислота (LA)	мг (mg)	4200,0	542,0
				Арахідонова кислота (ARA)	мг (mg)	62,0	8,0

*цукри, що отримуються з молока

Приготування

Будь ласка, уважно дотримуйтеся інструкцій при приготуванні суміші. Неправильне приготування або зберігання суміші протягом тривалого часу може завдати шкоди здоров'ю вашої дитини, в тому числі, через зростання небажаних бактерій. Завжди готуйте свіжу молочну суміш перед годуванням і не використовуйте залишки раніше приготованої суміші. **Завжди використовуйте суміш протягом 2-х годин.**

Завжди стерилізуйте посуд для годування перед приготуванням суміші. Миття та ополіскування пляшечки і соски мають бути ретельними.

- Закип'ятіть свіжу питну воду та охолодіть її протягом півгодини або до температури 70°C.
- Вилийте підготовлену воду в пляшечку для годування.
- Наповніть мірну ложку сухою сумішшю, зніміть надлишок тупим краєм чистого ножа. Висипте рекомендовану кількість суміші в пляшечку для годування.
- Щільно закрийте пляшечку та енергійно струсіть її.
- Охолодіть готову молочну суміш до температури годування (приблизно 37°C). Перевірте температуру!

Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування.

Будь ласка, не підігрівайте молочну суміш в мікрохвильовій печі (небезпека перегріву!).

Якщо вам потрібні додаткові поради, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Дозування

Кожна дитина індивідуальна, тому і кількість молочної суміші на одне годування може різнитися. Вашій дитині не обов'язково випивати всю пляшечку до кінця. **Будь ласка, використовуйте мірну ложку тільки з цієї упаковки.**

На кожную мірну ложку без верху сухої суміші додавайте 30 мл кип'яченої води. 1 мірна ложка без верху = приблизно 4,3 г сухої суміші.

Вік дитини	Приблизна вага дитини, кг	Кількість свіжопип'яченої та охолодженої води на один цикл годування, мл	Кількість ложок для приготування суміші	Кількість годувань на добу
з народження до 1 тижня	3,0	90	3	6
від 1 до 4 тижнів	3,5	120	4	5
від 1 до 2 місяців	4,5	120	4	5
3 місяці	5,5	150	5	5
від 4 до 5 місяців	6,5	180	6	5
6 місяців	8	210	7	4

Пам'ятайте про необхідність своєчасного введення прикормів. Стосовно цього проконсультуйтеся, будь ласка, з лікарем **Важлива інформація для харчування вашої дитини.** Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком споживання молочної суміші необхідна консультація лікаря. Можлива індивідуальна підвищена чутливість до будь-якого компонента продукту.

Kendamil Дитяча суха молочна суміш першого етапу забезпечує вашу дитину всім необхідним до настання часу введення прикорму:

- всі основні поживні речовини
 - поліненасичені жирні кислоти DHA Омега-3, особливо важливі у перші місяці життя, оскільки організм дитини такого віку самостійно їх не виробляє
 - містить тільки лактозу: ви можете годувати сумішшю Kendamil 1 етапу так довго і так часто, як потребує ваша дитина.
- Kendamil 1 етапу призначено для задоволення особливих харчових потреб немовлят та легко засвоюється.

Упаковано в захисному середовищі. Перед першим використанням перевірте герметичність внутрішнього пакету: при натисканні двома руками на пакет з нього не повинне виходити повітря та/або висипатись суміш.

При порушенні герметичності - продукт не використовуйте.

Непочатий пакет (упаковку) зберігайте у сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від 3°C до 25°C та уникайте перепаду температур. Початий пакет щільно закривайте та зберігайте у сухих та гігієнічних умовах при кімнатній температурі до 25°C. Не зберігати в холодильнику. Вміст відкритого пакету використовуйте протягом 4-х тижнів.

Маса нетто: 400 г.

Дата виробництва: див. після «MANF» (день, місяць, рік).

Дата завершення мінімального терміну придатності **«Краще спожити до»:** див. після «BEST BEFORE» (день, місяць, рік).

Номер партії: див. на дні упаковки.

Виробник: «Kendal Nutricare Ltd», Mint Bridge Road, Kendal, Cumbria, LA9 6NL; Great Britain, («Кендал Нутрікар Лтд», Мінт Брідж Роад, Кендал, Камбрія, ЛА9 6НЛ), Велика Британія.

Імпортер та підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживача: ТОВ «Бєбішоп», Україна, 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28, тел.: (044) 323-09-01, код за ЄДРПОУ 41172555.

www.babyshop.ua

KM_C1_400_L2